

METANEPHRIN

VIZELETVIZSGÁLAT

Mikor végzik?

A metanephrin a katecholaminoknak, azaz az epinephrinnek (adrenalinak) és a norepinephrinnek az inaktív metabolitja. A vizsgálat segít diagnosztizálni vagy kizárni a pheochromocytomát (a mellékvese daganatát) vagy egyéb neuroendokrin tumort.

Előkészületek

24 órán keresztül gyűjtött vizeletre van szükség a vizsgálathoz, melyet a gyűjtés ideje alatt a hűtőszekrényben, sötét helyen kell tárolni. Az érzelmi és a fizikai stresszt, valamint a megerőltető fizikai munkát, sporttevékenységet is minimalizálni kell a mintagyűjtés előtt és alatt, mivel ezek is képesek emelni a katecholaminok kiválasztását.

NORMETANEPHRIN

VIZELETVIZSGÁLAT

Mikor végzik?

A normetanephrin a katecholaminoknak, azaz az epinephrinnek (adrenalinak) és a norepinephrinnek az inaktív metabolitja. A vizsgálat segít diagnosztizálni vagy kizárni a pheochromocytomát (a mellékvese daganatát) vagy egyéb neuroendokrin tumort.

Előkészületek

24 órán keresztül gyűjtött vizeletre van szükség a vizsgálathoz, melyet a gyűjtés ideje alatt a hűtőszekrényben, sötét üvegben és helyen kell tárolni. Az érzelmi és a fizikai stresszt, valamint a megerőltető fizikai munkát, sporttevékenységet is minimalizálni kell a mintagyűjtés előtt és alatt, mivel ezek is képesek emelni a katecholaminok kiválasztását.